

	BADANY PARAMETR																
Jednostka	Woda		Fruktoza (F)		Glukoza (G)		Sacharoza	F+G		F/G		Turanoza	Maltoza	Trehaloza	Izomaltoza	Erloza	Melecytoza
	%	Z-score	g/100 g	Z-score	g/100 g	Z-score	g/100 g	g/100 g	Z-score		Z-score						
X _{średnia}	15,2		36,0		31,8		-	67,8		1,13		1,5	3,6	2,3	0,8		
Mediana	15,2		36,5		32,0		-	69,1		1,11		1,5	3,6	2,3	0,8		
SD	0,6		2,1		1,5		-	3,4		0,04		0,0	0,2	0,4	0,4		
Min	14,3		32,4		29,3		-	61,7		1,10		1,5	3,5	2,0	0,5		
Max	16,1		37,8		33,2		-	69,8		1,18		1,5	3,7	2,6	1,1		
Nr Lab																	
01	15,0	-0,29	36,5	0,26	33,2	0,91	<0,5	69,70	0,56	1,10	-0,79						
02	15,6	0,73	36,4	0,20	32,7	0,59	<0,5	69,1	0,38	1,11	-0,51						
03	15,3	0,22					1,31*	75,76*									
04	15,2	0,05					2,55*	70,72*									
05	16,1	1,58	32,4	-1,72	29,3	-1,67	3,4	61,7	-1,77	1,10	-0,79						
06	14,3	-1,48	37,8	0,90	32,0	0,12	<0,5	69,8	0,60	1,18	1,46	1,5	3,7	2,6	1,1	0,6	0,4
07	14,7	-0,80	36,7	0,35	31,9	0,05	<0,5	68,6	0,24	1,15	0,62	1,5	3,5	2,0	0,5	<0,5	<0,5

*Oznaczenie wykonano metodą wg PN-88/A-77626 pkt. 5.3.4 (Lane-Eynona), pozostałe wyniki dla zawartości cukrów uzyskano metodą HPLC. W obliczeniach statystycznych łącznej zawartości fruktozy i glukozy uwzględniono tylko wyniki uzyskane metodą HPLC.

	BADANY PARAMETR													
	HMF		LD		pH		Wolna kwasowość		Przewodność		Prolina	Barwa		Pylek występujący w najwyższym procencie
Jednostka	mg/kg	Z-score	Schade	Z-score		Z-score	mval/kg	Z-score	mS/cm	Z-score	mg/100 g	skala Pfunda	Z-score	
Xśrednia	4,0		39,3		4,47		34,3		0,91			108,3		
Mediana	4,4		39,1		4,46		33,8		0,89			107,5		
SD	1,8		4,66		0,16		1,9		0,09			24,7		
Min	1,5		30,7		4,26		32,0		0,80			83		
Max	7,1		44,6		4,75		36,7		1,04			135		
Nr Lab														
01	3,1	-0,52	37,9	-0,32	4,50	0,19	32,5	-0,95	0,89	-0,30				
02	4,9	0,46	30,7	-1,86	4,75	1,73	35,0	0,39	0,87	-0,46		135	1,08	Miód spadziowy ze spadzi liściastej
03	4,4	0,21	39,1	-0,05	4,26	-1,28	36,6	1,24	0,89	-0,21				
04	4,6	0,31	41,7	0,51			32,0	-1,22	1,04	1,40		83	-1,02	Miód spadziowy ze spadzi liściastej
05	7,1	1,69	37,9	-0,31	4,38	-0,54	36,7	1,27	1,04	1,37		123	0,60	
06	1,5	-1,41	43,5	0,90	4,44	-0,17	33,4	-0,47	0,80	-1,23				Spadziowy
07	2,7	-0,74	44,6	1,13	4,48	0,07	33,8	-0,26	0,86	-0,57	72,0	92	-0,66	Spadziowy

oznaczenie wykonano metodą HPLC wg RMRiRW z dnia 14.01.2009 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 94) pkt. IV, pozostałe wyniki dla zawartości HMF uzyskano metodą spektrofotometryczną (Winklera wg PN-88/A-77626, pkt. 5.3.8)